


GoalTM 2XL

HERBICIDA



Grow a better tomorrow



GoalTM 2XL

HERBICIDA

GENERALIDADES:

Muestra un excelente desempeño en el control de maleza, además de mayor seguridad para el cultivo, la salud humana y el medio ambiente. Es un herbicida que brinda un amplio espectro de control en las principales malezas gramíneas y de hoja ancha, aplicado ya sea de manera pre-emergente o post-emergente temprana, con prolongado efecto residual.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Marca:

Goal 2xL

Nombre común:

Oxifluorfen

Grupo químico:

Difenil Eter

Formulación:

Concentrado Emulsionable

Concentración:

240 g de i.a. /lt

Malezas que controla:

Quelite o bleado (*Amaranthus* spp), Chual (*Chenopodium* spp), Diente de León (*Taraxacum officinale*), Empanadilla (*Commelina diffusa*), Lengua de vaca (*Rumex crispus*), Meloncillo (*Cucurbita* spp), Zacate salado (*Leptochloa* spp), Zacate Johnson (semilla), (*Sorghum halepense*), Tomatillo (*Physalis* spp), Trebol amarillo (*Melilotus indicus*), Verdolaga (*portulaca oleraceae*), Aceitilla (*Bidens pilosa*) Cadillo (*Cenchrus echinatus*) Espiguilla (*Poa annua*), Zacate pata de gallo (*Eleusine indica*), Zacate bromo (*Bromus* spp), Alambriño (*Polygonum* spp), Hierba mora (*Solanum nigrum*), Torito (*Tribulus terrestris*), Trompillo (*Ipomoea* spp) Borraja (*Sonchus* spp), Alpistillo (*Phalaris minor*), Cola de zorra (*Setaria* spp), Zacate de agua (*Echinochloa* spp)

BENEFICIOS:

- Excelente control pre-emergente y post-emergente a la maleza.
- Producto con excelente residualidad
- Excelente control sobre gramíneas, ciperáceas y hojas anchas.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	Época de la aplicación
Algodonero (75)	1.5 – 2.0	Post-emergente dirigido a la base del cultivo.
Cafeto (1)	2.5	Pre-emergente o post-emergente en mezcla.
Cebolla (45)	1.0 – 1.5	Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.
Col, coliflor, brócoli (35)	1.0 – 1.5	Pre-trasplante, 1 a 5 días antes de éste.
Soya (60)	1.0 – 1.5	Pre-emergente y post-emergente dirigida.
Peral, durazno, ciruelo, nogal, almendro (1)	2.0 – 4.0	Pre-emergente y post-emergente en mezcla.
Ornamentales (SL)	2.0 – 4.0	Post-emergente dirigida.
Platano (1)	2.0 – 2.5	Post-emergente dirigida al pie del cultivo.
Vid (21)	1.5 – 3.0	Pre-emergente a malezas y dirigidas al pie del cultivo, únicamente post-cosecha.

(I) Intervalo de seguridad días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
SL: Sin Límite.

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas.

Nufarm México

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Av. Moctezuma 3515 Local 5 Zona Col. Ciudad del Sol. ZAPOPAN, JALISCO, 45050 TEL: (33) 3121 4108

www.nufarm.com

